

## عوارض جانبی جمسیتابین هیدروکلراید آزودوس :

در صورت مواجهه با هر یک از عوارض جانبی زیر باید بلافاصله به پزشک تماس بگیرید :

- تب یا عفونت (رایج): در صورت درجه حرارت مساوی یا بالاتر از ۳۸ درجه سانتی گراد ، تعریق و یا سایر نشانه های عفونت (از آنجایی که ممکن است گلبولهای سفید کمتر از حالت طبیعی باشد که بسیار معمول است).
  - ضربان قلب نامنظم (آریتمی) (با فراوانی ناشناخته).
  - درد، قرمزی ، تورم و یا زخم در دهان (رایج).
  - واکنش های آلرژی: بثورات پوستی (بسیار رایج) / خارش (رایج)، یا تب (بسیار معمول است).
  - خستگی، احساس ضعف ، کوتاهی تنفس و یا رنگ پریدگی (ممکن است هموگلوبین کمتر از حالت طبیعی باشد که بسیار معمول است).
  - خونریزی از لثه ها، بینی یا دهان و یا هر خونریزی مداوم، ادرار قرمز یا صورتی، کبودی ناگهانی (از آنجایی که امکان است پلاکت کمتر از وضعیت طبیعی باشد، که بسیار معمول است).
- Gemcitabine که زود گذر است بسیار رایج است ، با این حال Azevedos- تنفس مشکل (مشکلات تنفسی خفیف پس از مشکلات شدید ریه بصورت غیر معمول یا بندرت می تواند وجود داشته باشد .)

### - عوارض جانبی با پودر Gemcitabine ممکن است شامل :

#### عوارض جانبی بسیار رایج

- سطح پایین هموگلوبین (آنمی)؛
- کاهش گلبول های سفید خون ؛
- کاهش پلاکت؛
- مشکلات تنفسی؛
- استفراغ ؛
- تهوع ؛
- راش پوستی- راش پوستی آلرژیک، اغلب خارش دار؛
- ریزش مو؛
- مشکلات کبد: که از طریق نتایج آزمایش خون غیر طبیعی حاصل می شود؛
- خون در ادرار؛
- آزمایش ادرار غیر طبیعی: پروتئین در ادرار؛
- علائم شبیه آنفولانزا شامل تب؛

- ادم (تورم مچ پا، انگشتان، پاها، صورت).

### عوارض جانبی شایع

- تب همراه با تعداد پایین گلبولهای سفید خون (نوتروپنی ناشی از تب)؛

- بی اشتها (کم اشتها)؛

- سردرد؛

- بی خوابی؛

- خواب آلودگی؛

-سرفه؛

- آبریزش بینی؛

-یبوست؛

-اسهال؛

-درد، قرمزی، تورم و زخم در دهان؛

-خارش؛

-تعریق؛

-درد عضلانی؛

-کمر درد؛

-تب،

-ضعف؛

-لرز.

### عوارض جانبی غیر معمول

- پنومونی بینابینی (زخم کیسه های هوایی ریه)؛

- اسپاسم راه های هوایی (خس خس کردن)؛

- وضعیت غیر طبیعی قفسه سینه با اشعه ایکس / اسکن

### عوارض جانبی نادر

- حمله قلبی (انفارکتوس میوکارد)؛

- فشار خون پایین؛

- پوسته پوسته شدن، زخم و تاول زدگی؛

- واکنش های محل تزریق.

## عوارض جانبی بسیار نادر

- افزایش تعداد پلاکت؛
- واکنش آنافیلاکتیک (حساسیت شدید / واکنش آلرژیک)؛
- پوسته پوسته شدن و تاول های شدید پوست.

## عوارض جانبی با فراوانی ناشناخته

- ضربان قلب نامنظم (آریتمی)؛
  - سندرم دیسترس تنفسی بزرگسالان (التهاب شدید ریه که باعث ناتوانی در تنفس می شود)
- Radiation recall** (راش پوستی مانند آفتاب سوختگی شدید) که می تواند بر روی پوستی که قبلا در معرض پرتو درمانی قرار گرفته ، رخ دهد،
- وجود مایع در ریه ها؛
  - مسمومیت با پرتو- آسیب کیسه های هوایی ریه در ارتباط با پرتو درمانی ؛
  - کولیت ایسکمیک (التهاب پوشش داخلی روده بزرگ، ناشی از کاهش خونرسانی )
  - نارسایی قلبی؛
  - نارسایی کلیه؛
  - گانگرن انگشتان دست و پا؛
  - آسیب کبدی شدید، از جمله نارسایی کبد؛
  - سکتة مغزی.

برخی از این نشانه ها و / یا شرایط ممکن است مشاهده شود. پزشک را در اسرع وقت ،در زمان شروع هر یک از این عوارض مطلع نمایید. اگر در مورد هر گونه عارضه جانبی نگران هستید، با پزشک در میان بگذارید.

در صورت وجود هرگونه عارضه جانبی و یا هر عارضه ی جانبی شدید دیگری که در این بروشور درج نشده بود ، لطفا به پزشک یا داروساز خود در میان بگذارید.